

**ПРОДУКТИ ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ (РОДЕНТИЦИДИ) И
ДРУГИ ГРЪБНАЧНИ НЕПРИЯТЕЛИ (СЛЯПО КУЧЕ И КЪРТИЦА)**

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Поле (П), Оранжерия (О) или Закрито помещение (З)	Карантин ен срок в дни	Категория за употреба	Действие на продукта по отношение на проникването му в растението/ Забележка
1.	АРВАЛИН Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия Разрешение № 01844- ПРЗ-1/26.05.2020 г. Заповед №РД 11-1020 от 20.05.2020 г. Валидно до: 30.04.2025 г.	цинков фосфид 25 г/кг	66 гр/дка на употреба/ 200 гр/дка на вегетационен период	Полски култури, зеленчукови култури, овощни култури, лозя, горски растения, тревни площи, пасища, ливади, декоративни видове Срещу полски мишевидни гризачи – внася се при необходимост, през всички сезони, през всички стадии от развитие на растенията Забележка: 5 броя на дупка в ход; 50 г продукт/родентицидна кутия; дозата от 200 г продукт може да бъде разделена на три приложения в доза 66 г/дка Брой мин/макс приложения - 3	П	-	втора професионална	
2.	ФОСТОКСИН пелети Деция Дегеш - Германия Удостоверение N 203/21.01.2005 г. Заповед РД 09- 440/04.06.2003 г.	алуминиев фосфид - 56 %		За третиране на зърно в силосни клетки в доза 4-12 пелети за тон зърно, внасяни с автоматичен дозатор в момента на насипване на зърното или 10-20 пелети/тон при ръчно залагане. -За третиране на стифирано в чували зърно в доза 5-10 пелети/м ³ , срещу: житна гъгрица (<i>Sitophilus granarius</i>), ивска аугрица (<i>Sitophilus oryzae</i>), малък зърнов бръмбар (<i>Rhizopertha dominica</i>), брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), зърнов молец (<i>Citotroga cerealella</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium</i>	З	45 дни за зърно; 60 дни за брашно	1	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

				<p><i>confusum</i>) суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), мавритански брашнояд (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrogineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>) при експозиция: 2 денонощия при температура над 20° C; 3 денонощия при температура 16-20° C; 4 денонощия при температура под 12-15° C; 8 денонощия при температура под 5-11° C; при температура под 5° C не се фумигира;</p> <p>-За третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти и фуражи - в доза 5-15 пелети м³;</p> <p>-За третиране на празни складове и мелници - обемна фумигация - в доза 10-15 пелети м³;</p> <p>срещу: житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), аугрица (<i>Sitophilus oryzae</i>), малък зърнов бръмбар (<i>Rhizoperla dominica</i>), брашмян бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), зърнов молец (<i>Citotroga cerealella</i>), малък брашмян бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>) суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), мавритански брашнояд (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrogineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>) молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), оловен молец (<i>Ephestia elutella</i>) при експозиция: 2 денонощия при температура над 20° C; 3 денонощия при температура 16-20° C; 4 денонощия при температура под 12-15° C; 8 денонощия при температура под 5-11° C; при температура под 5° C не се фумигира;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

				-За третиране на тютюн в бали, каси, бъчви в доза 2,5-5 пелети/м ³ ; срещу: тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma sericorne</i>) е о?о?нев молец (<i>Ephestia elutella</i>) при експозиция: 2 денонощия при температура над 20° С; 3 денонощия при температура 16-20° С; 4 денонощия при температура под 12-15° С; 8 денонощия при температура под 5-11° С; при температура под 5° С не се фумигира; -Срещу сляпо куче (<i>Spalax leucodon</i>), къртица (<i>Talpa europea</i>), полевка (<i>Microtus arvalis</i>) в доза 2-5 пелети/обитаем ход				
3.	ФОСТОКСИН таблетки Деция Дегеш - Германия Удостоверение No160/16.03.2004г	56 % алуминиев фосфид	20 табл./100 м 2	Срещу сляпо куче (<i>Spalax leucodon</i>)	3	за зърно - 45; за брашно - 60 дни	1	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията